Dysphagie en réanimation : Une approche pluridisciplinaire

J. Becquet, infirmière spécialisée en soins intensifs et neuro-rééducation aigue, CHUV – SIA/Unité NRA Lausanne, Suisse

A. Lattion, kinésithérapeute cardio-respiratoire, CHUV – SIA Lausanne, Suisse

I. Physiologie de la déglutition

II. Dysphagie

Impact du séjour en réanimation

III. Notre approche pluridisciplinaire

Prévention selon F.O.T.T.[®]

Prise en charge : évaluation et traitement

I. Physiologie de la déglutition

II. Dysphagie

Impact du séjour en réanimation

III. Notre approche pluridisciplinaire

Prévention selon F.O.T.T.[®]

Prise en charge : évaluation et traitement

I. Physiologie de la déglutition

II. Dysphagie

Impact du séjour en réanimation

III. Notre approche pluridisciplinaire

Prévention selon F.O.T.T.[®]

Prise en charge : évaluation et traitement

I. Physiologie de la déglutition

II. Dysphagie

Impact du séjour en réanimation

III. Notre approche pluridisciplinaire

Prévention selon F.O.T.T.[®]

Prise en charge : évaluation et traitement

Pas de consensus littéraire

Dysphagie

Altération du transit du bol alimentaire ou de sécrétions (salive, ...) de la bouche vers l'estomac.

Inhalation ou « fausse route »

Passage de particules alimentaires ou de sécrétions dans les voies aériennes (VA), avec ou sans mécanismes d'expulsion.

Mécanismes d'expulsion

Moyens de dégagement physiologiques des VA lors d'inhalation : toux, hémmeage.

RÔLES DE LA DÉGLUTITION

**PROTECTION DES
VA**

NUTRITION

Transport œsophagien

COORDINATION RESPIRATION - DÉGLUTITION

Modification des cycles respiratoires :

- Apnée = protection des VA
- 80% durant phase expiratoire
- Déglutition suivie d'une expiration
- Vt du cycle suivant est augmenté

**La respiration prime sur
la déglutition !**

INHALATION OU « FAUSSE ROUTE »

Signe de gravité

Absence inhalation ≠ absence dysphagie

Silencieuse chez 36% des patients !

Aliments, liquides, salive, sécrétions, ...

INCIDENCE EN RÉANIMATION

CONSÉQUENCES

Court terme	Moyen - long terme
Inhalation : → Hypoxie, obstruction bronchique, atélectasies, bronchospasme, ... → 11x plus de pneumonie	↓ Qualité de vie ↓ Retour à domicile ↑ Morbidité
Dénutrition	↑ Mortalité de 9,2% à 90 jours
Déshydratation	↑ Coûts de la santé
↑ Séjour en réa et hospitalier

F.O.T.T.® - Facial Oral Tract Therapy

Développée par Kay Coombes selon les principes Bobath®

Approche thérapeutique intégrant :

- Déglutition réflexe
- Prise alimentaire
- Mouvements faciaux
- Voix et parole

→ Application systématique aux soins d'hygiène buccale

PATIENTS CIBLES

- Intubés ou trachéotomisés
- Avec accès et/ou état buccal problématique
- Dépendants pour soins d'hygiène
- Présentant dysphagie

OBJECTIFS

- Limiter déprivation neuro-sensorielle
- Offrir fréquemment la possibilité de déglutir
- Limiter réactions de défense
- Choisir une position favorable
- Ritualiser l'hygiène et l'humidification buccale

Goût - Odorat Fonction Neuro-sensorielle Majeure

Émotion → Mouvement

Principe : Maintenir les fonctions de la sphère ORL

Respirer

Source de plaisir

S'exprimer

Déglutir

Vocaliser / Parler

Émotion

Chanter

DÉROULEMENT SELON F.O.T.T.[®]

Positionnement

Stable, sécuritaire et confortable → **facilitateur**

Tête en flexion vers l'avant

Réalisation

- Prise KKG (KieferKontrollGriff®)
 - Contrôle tête
 - Stabilisation mâchoire pour recrutement musculaire
 - Facilitation tactile déglutition
- Par cadran
 - Lèvre supérieure la plus sensible
 - Offrir des temps de pause pour déglutir
- Eau froide

Tableau comparatif

Hygiène de la bouche standard

Eau + dentifrice
Chlorhexidine buccale 2X/J
(Prévention VAP)

Brosse à dents
Bâtonnets mousse
Compresse + gants

Position 30°

Laver sécher aseptiser
2X/J Min

Hygiène de la bouche selon FOTT®

Eau + dentifrice
Chlorhexidine buccale 2X/J
(Prévention VAP)

Brosse à dents
Bâtonnets mousse
Compresse + gants

Position stable sécurisée
Assis 45° ou PLS

Laver sécher aseptiser
2X/J Min

Procédure neurosensorielle
coordonnée

Stimulation buccale selon FOTT®

Liquide savoureux
Sirop, Thé, Café

Gants

Position stable sécurisée
Assis 45° ou PLS

Stimulation
neurosensorielle du goût
et de l'odorat

Procédure neurosensorielle
coordonnée

RECOMMANDATIONS D'ÉVALUATION

Gold Standard	Adaptations en réanimation
Évaluation instrumentale : <ul style="list-style-type: none">- Nasofibroscopie- Vidéo-fluoroscopie	<ol style="list-style-type: none">1) Screening infirmier systematique post-extubation ↓2) Selon screening : évaluation complète au lit du patient par thérapeute formé ↓3) Si évaluation précédente non suffisante : évaluation instrumentale

Procédure

Déglutition au SMA

Rédigé par : Justine Busch et Flore Buella	
Validé par la direction élargie du SMA du : 8.12.2016	
Dernière mise à jour : 8.12.2016	Version : n°1

- Procédure
- Rappel théorique pour les patients des soins intensifs
- Spécificité de la prise en charge de la déglutition avec la canule de la trachéotomie
- En pratique et par étape :
 - Test de screening
 - o Mise en évidence d'une population à risque de développer une dysphagie
 - o Test à l'eau réalisé par l'infirmière
 - o Rééducation faite par le physiothérapeute
- Transmission infirmière-physiothérapeute
- Complications/ risques/ dangers
- Critères d'arrêt de la prise en charge de la déglutition
- Annexes : Tableau récapitulatif des liquides et textures et Panneau d'indication pour la stratégie à adopter lors de l'alimentation.
- Référence

Évaluation comp

Rééducation et adap

Alimentation avec

st à l'eau

Alimentation normale

Procédure

Patient cible : Patient des soins intensifs dont l'alimentation orale est envisagée.

Intervenants :

Médecin :
Autorise l'essai alimentaire et la rééducation à la déglutition.

Infirmière :

- Dépiste les patients à risque :
 - o Si patient considéré à risque → avertir physiothérapeute
 - o Si le patient n'est pas à risque → Réalise test à l'eau
- Transmet au physiothérapeute

Physiothérapeute :

- Précise le déficit
- Rééduque
- Met en place une stratégie de prise en charge
- Transmet à l'infirmière la stratégie pour l'alimentation

Aide soignante/ ASSC :
Permet l'alimentation en toute sécurité lors des repas

Patient stable post-extubation

Prescription

	Oui	Non		Oui	Non
Affections ORL : <ul style="list-style-type: none"> ○ Chirurgies ○ Tumeurs ○ Séquelles post radique 	☐	☐	Variables médicales <ul style="list-style-type: none"> ○ Canule de trachéotomie ○ Antécédent de pneumonie sur broncho-aspiration 	☐	☐
Affections neurologiques : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pathologies dégénératives (SLA, SEP,...) ○ AVC ○ Troubles persistants de l'état de conscience. 	☐	☐			

Description du test à l'eau réalisé par les infirmières :

- **Position du patient** : en position assise, dossier à 90°. Si possible, installer le patient au fauteuil avant de débiter le test de screening.
- **Position du soignant** : en face du patient à la hauteur du patient voire légèrement plus bas afin d'éviter l'extension de la colonne cervicale.
- **Le matériel utilisé** : un gobelet blanc en plastique.
- **Texture** : eau plate.
- **Quantité** : 60 cl d'eau plate (un demi verre d'eau).
- **Consigne donnée au patient** : le patient doit déglutir le demi gobelet d'eau plate en entier. Il peut déglutir plusieurs fois à la suite.
- **Rôle du soignant** : observer la déglutition et repérer si un des critères ci-dessous est présent.

TEST A L'EAU inspiré du « Massey bedside swallowing screen, GUSS test »

	Oui	Non	
Qualité de la parole après la déglutition :			Si présence d'un des critères («oui »), il faut interrompre le test de screening. L'évaluation de la déglutition est poursuivie par les physiothérapeutes.
○ Voix mouillée	☐	☐	
○ Voix chuchotée, faible ou absente	☐	☐	
Observation de la déglutition spontanée :			
○ Impossible	☐	☐	
○ Difficile	☐	☐	
○ Douloureuse	☐	☐	
Qualité de la toux :			
○ Toux associée lors de la déglutition	☐	☐	
○ Etouffement lors de la déglutition	☐	☐

Kiné

Évaluation col

Rééducation et a

Alimentation a

Informations générales	
Type de bilan	O Initial O Suivi
Motif du bilan	O Evaluation reprise alimentaire O Suspicion troubles déglutition O Patient à risque post-extubation (<i>screening positif</i>)
Status ORL	O Oui, résumé : O Non O A demander
Plaintes du patient	(P. ex. : <i>faim/soif, douleur, blocage, voix, etc.</i>)
Dispositif d'alimentation	O SNG / SNJ O PEG / GPR / PEG-J O Aucun
Trachéotomie	O Non O Oui (<i>type de canule, diamètre, bouchon</i>) :
Éléments du status « Red flags »	
État général du patient	
<ul style="list-style-type: none"> - État neurologique (<i>vigilance, compréhension, fatigabilité</i>) : - Position / tonus global : - Status respiratoire (<i>FIO₂, SpO₂, FR, encombrement, stase, etc.</i>) : - Coordination respiration-déglutition (<i>possibilité d'apnée</i>) : 	
État buccal	
<ul style="list-style-type: none"> - Muqueuses (<i>sécheresse, lésion, ...</i>) : - Dentition : 	
Évaluation bucco-linguo-faciale (<i>sangle labio-jugale, mandibule, langue, voile du palais</i>)	
<ul style="list-style-type: none"> - Mobilité (<i>amplitude, tonus, symétrie</i>) : - Sensibilité : 	
Toux	O Efficace sur demande/spontanée (= <i>mécanisme d'expulsion adéquat</i>) O Inefficace O Absente
Déglutition (<i>salive, liquide, solide, médicaments, etc.</i>)	
Réflexes	O Déglutition salivaire (<i>automatique</i>) O Archaïques (<i>morsure, succion, mâchonnement</i>) O Nauséeux
Phase orale - préparation	O Défaut de contention (<i>ant./post.</i>) O Trouble de la mastication O Trouble de l'insalivation O Défaut de sensibilité / goût
Phase orale - transport	O Défaut de contrôle O Défaut de propulsion
Phase pharyngée	O Défaut de déclenchement O Défaut de transport (<i>péristaltisme / recul base de langue</i>) O Défaut de protection des VA : <ul style="list-style-type: none"> o Défaut de fermeture vélo-pharyngée o Défaut de fermeture laryngée o Défaut d'expulsion O Défaut d'ouverture SSO (<i>sensation de blocage</i>)
Voix (<i>avant, pendant et après la déglutition</i>)	
O Audible, claire O Dysarthrie O Rhinolalie (<i>voix nasonnée = insuffisance voile du palais</i>)	O Soufflée O Forcée O Timbre modifié O Fatigabilité O Débit limité (<i>limitation respiratoire</i>)
Conclusions du bilan	
<ul style="list-style-type: none"> - Résumé des déficits observés - Conditions de déglutition sécuritaire 	
Proposition pour la suite de PeC	
<ul style="list-style-type: none"> - Axes de travail, exercices à réaliser - Éléments à réévaluer ou tester 	

à l'eau

Alimentation normale

Dans L'unité de neuroréducation aiguë De la Professeure Karin Diserens

Neurosensory stimulation outdoors enhances cognition recovery in cognitive motor dissociation: A prospective crossover study

Caroline Attwell¹, Jane Jöhr¹, Alessandro Pincherle¹, Jean-Michel Pignat¹, Nina Kaufmann¹,
Jean-François Knebel¹, Loric Berney¹, Philippe Ryvlin¹, Karin Diserens¹

Projet d'étude : évaluation du NOX T3®
(Resmed) pour objectiver l'efficacité de
la stimulation selon F.O.T.T.®

TAKE HOME MESSAGE

Concerne la plupart de nos patients de réa...

Prévention et dépistage :
systématisés et précoces.

Stratégies pluridisciplinaires
à mettre en place !