Neuroprotection post arrêt cardiaque ?

Mélissa JÉZÉQUEL, IDE

Hôpital COCHIN, Assistance Publique Hôpitaux de Paris

AP-HP. Centre
Université
Paris Cité

Université
Paris Cité

+ Liens d'intérêt

BD / BARD : frais de conférence

+ Quelques rappels

40.000 ACR/an

60% RCP

15-20% RACS...

Période pré-hospitalière

... et d'admissions en réa

8-9% survivants

7% CPC1-2

Long terme

Post-arrêt cardiaque :

- Choc et défaillances d'organes
- Lésions cérébrales post-anoxiques

Mortalité en soins intensifs après arrêt cardiaque

+Prévention des ACSOS

Oxygénation

**Lutter contre
l'hyperthermie**

Capnie

Pression artérielle

Glycémie

Comment gérer la PaO₂ après un + arrêt cardiaque

SaO₂ ?

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

Adapté de Sandroni C, Minerva Anesth, 2014

Etude observationnelle rétrospective

Independent predictors of in-hospital mortality

Variable	OR (95% CI)	P Value
Age decile	1.1 (1.1-1.2)	<.001
Emergency department origin	1.5 (1.3-1.7)	<.001
Nonindependent functional status at admission	1.3 (1.1-1.4)	<.001
Chronic renal failure	1.6 (1.3-1.9)	<.001
Active chemotherapy	2.8 (1.8-4.6)	<.001
High heart rate in ICU ^b	1.9 (1.7-2.1)	<.001
Hypotension at ICU arrival ^c	2.1 (1.9-2.3)	<.001
Hypoxia exposure	1.3 (1.1-1.5)	.009
Hyperoxia exposure	1.8 (1.5-2.2)	<.001

No. at risk	0	7	14	21	28
Normoxia	1171	514	236	129	83
Hyperoxia	1156	406	211	115	70

Kilgannon JH et al, JAMA, 2010

SaO₂ ?

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+Recommandations 2021 ERC/ESICM

Faudra-t-il cibler certaines valeurs de SaO₂ ?

- **Oui, il faut cibler une SaO₂ normale**
- **Cible : 94-98%**
- **Eviter l'hypoxie et l'hyperoxie +++**
- **Adapter la FiO₂**
- **Régler les alarmes !**

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+Box-Trial

Cible d'oxygène chez les patients en coma en post arrêt-cardiaque

- Essai randomisé en double aveugle
- 789 patients
- Restrictif (68 à 75 mmHg)
- Libéral (98 à 105 mmHg)

H. Schmidt et Al. NEJM 08/2022

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ EXACT Trial

- Essai randomisé, multicentrique
- Intervention (90 à 94%)
- Standard (98 à 100%)

Figure 2. Subgroup Analysis of Survival to Hospital Discharge

Stephen A. Bernard, MD et Al. JAMA. 10/2022

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ Comment gérer la Pa
après un arrêt cardiaque ?

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ Débit sanguin cérébral et PaCO₂

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ PaCO₂ et devenir neurologique en post ACR

16,542 ACR dans 125 réanimations entre 2000 et 2011
18% hypocapnie // 41% d'hypercapnie

L'hypocapnie après ACR est délétère

L'hypercapnie > 45 mmHg n'est pas significativement associée à la mortalité hospitalière (et serait même associée à un retour à domicile chez les survivants)

Schneider et al, Resuscitation, 2013

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+Et pourtant...

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

HYPO- HYPERVENTILATION

(réglages de la FR et du Vt)

HYPOTHERMIE

HYPO- HYPERCAPNIE IATROGÈNE

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ Hypercapnie légère thérapeutique ciblée après un arrêt-cardiaque

A)

Chez les patients en arrêt cardiaque admis aux soins intensifs, le TTMH était faisable, semblait sûr et atténuait la libération de NSE par rapport au TN. Ces résultats justifient une étude plus approfondie de ce nouveau traitement.

TAME Trial (en attente des résultats)

Eastwood et al. Critical Care (2017)

SaO₂ = 94-98%

PaCO₂ ?

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+Recommandations 2021 ERC/ESICM

Faudra-t'il cibler certaines valeurs de PaCO₂ après un ACR ?

- Cibler une PaCO₂ normale
- Eviter l'hypocapnie +++
- Surveiller GDS artériel
- Monitorer l'EtCO₂ →
- TAME Cardiac Arrest en cours...

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ Comment gérer la glycémie après un arrêt cardiaque ?

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ Toxicité cérébrale de l'hyperglycémie

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

Glycémie ?

PA ?

Température ?

Fabrice Daviaud
Florence Dumas
Nadège Demars
Guillaume Geri
Adrien Bouglé
Tristan Morichau-Beauchant
Yên-Lan Nguyen
Wulfran Bougouin
Frédéric Pène
Julien Charpentier
Alain Cariou

Blood glucose level and outcome after cardiac arrest: insights from a large registry in the hypothermia era

• **HYPERGLYCEMIE** →
**altération du
neuropronostic**

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

Glycémie ?

PA ?

Température ?

Tuomas Oksanen
Markus B. Skrifvars
Tero Varpula
Anne Kuitunen
Ville Pettilä
Jouni Nurmi
Maaret Castrén

Strict versus moderate glucose control after resuscitation from ventricular fibrillation

- **Contrôle strict vs Contrôle modéré → PAS DE BENEFICE**

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

Glycémie ?

PA ?

Température ?

+ Recommandations 2021 ERC/ESICM

Faudra-t-il cibler certaines valeurs de glycémie après un arrêt cardiaque ?

- **Cibler une glycémie < 10mmol/L**
 - *(insuline si besoin... selon protocole..)*
- **Eviter les hypoglycémies +++**
- **Ne pas rechercher un contrôle strict**

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

Glycémie ?

PA ?

Température ?

Comment gérer la pression artérielle + après un arrêt cardiaque ?

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PA ?

Température ?

+ Régulation du débit sanguin cérébral

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PA ?

Température ?

L'hypotension artérielle précoce est fréquente dans le syndrome post arret-cardiaque et associée à une augmentation de la mortalité hospitalière

Kilgannon JH et al. Resuscitation 2008

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT<10mmol/l

PA ?

Température ?

+ Cible de pression artérielle moyenne en post arrêt-cardiaque

Jakkula P et al. Intensive Care Med 2018

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PA ?

Température ?

+ Modifications de l'auto-régulation du flux sanguin cérébral après arrêt-cardiaque

ONE SIZE DOES NOT FIT ALL !!

Elmer J, Callaway CW. Semin Neurol 2017

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PA ?

Température ?

+ Cible de pression artérielle chez les patients dans le coma en post arrêt-cardiaque

- Essai randomisé en double aveugle
- 789 patients
- Restrictif (63 PAM)
- Libéral (77 PAM)

H. Schmidt et Al. NEJM 08/2022

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PA ?

Température ?

+Recommandations 2021 ERC/ESICM

Faudra-t-il cibler certaines valeurs de pression artérielle après un arrêt cardiaque ?

Monitorer le DSC et l'oxygénation cérébrale ?

- Cibler une PAM > 65 mmHg
- Recours aux amines vasopressives type NAD si besoin
- avec *PaS* > 100 mmHg
- **Monitoring invasif de la PA**

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PAM > 65 mmHg

Température ?

+ Comment gérer la température après un arrêt cardiaque ?

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PAM > 65 mmHg

Température ?

+ Contrôle de la température après arrêt-cardiaque

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest

Niklas Nielsen, M.D., Ph.D., Jørn Wetterslev, M.D., Ph.D., Tobias Cronberg, M.D., Ph.D., David Erlinge, M.D., Ph.D., Yvan Gasche, M.D., Christian Hassager, M.D., D.M.Sc., Janneke Horn, M.D., Ph.D., Jan Hovdenes, M.D., Ph.D., Jesper Kjaergaard, M.D., D.M.Sc., Michael Kuiper, M.D., Ph.D., Tommaso Pellis, M.D., Pascal Stammer, M.D., Michael Wanscher, M.D., Ph.D., Matt P. Wise, M.D., D.Phil., Anders Åneman, M.D., Ph.D., Nawaf Al-Subaie, M.D., Søren Boesgaard, M.D., D.M.Sc., John Bro-Jeppesen, M.D., Iole Brunetti, M.D., Jan Frederik Bugge, M.D., Ph.D., Christopher D. Hingston, M.D., Nicole P. Juffermans, M.D., Ph.D., Matty Koopmans, R.N., M.Sc., Lars Køber, M.D., D.M.Sc., Jørund Langergren, M.D., Gisela Lilja, O.T., Jacob Eifer Møller, M.D., D.M.Sc., Malin Rundgren, M.D., Ph.D., Christian Rylander, M.D., Ph.D., Ondrej Smid, M.D., Christophe Werer, M.D., Per Winkel, M.D., D.M.Sc., and Hans Friberg, M.D., Ph.D., for the TTM Trial Investigators*

TTM1

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Targeted Temperature Management for Cardiac Arrest with Nonshockable Rhythm

J.-B. Lascarrou, H. Merdji, A. Le Gouge, G. Colin, G. Grillet, P. Girardie, E. Coupez, P.-F. Dequin, A. Cariou, T. Boulain, N. Brule, J.-P. Frat, P. Asfar, N. Pichon, M. Landais, G. Plantefeve, J.-P. Quenot, J.-C. Chakarian, M. Sirodot, S. Legriel, J. Letheulle, D. Thevenin, A. Desachy, A. Delahaye, V. Botoc, S. Virmeux, F. Martino, B. Giraudeau, and J. Reigner, for the CRICS-TRIGGERSEP Group*

HYPERION

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ORIGINAL ARTICLE

Hypothermia versus Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest

J. Dankiewicz, T. Cronberg, G. Lilja, J. C. Jakobsen, H. Levin, S. Ullén, C. Rylander, M. P. Wise, M. Oddo, A. Cariou, J. Bělohávek, J. Hovdenes, M. Saxena, H. Kirkegaard, P. J. Young, P. Pelosi, C. Storm, F. S. Taccone, M. Joannidis, C. Callaway, G. M. Eastwood, M. P. G. Morgan, P. Nordberg, D. Erlinge, A. D. Nichol, M. S. Chew, J. Hollenberg, M. Thomas, J. Bewley, K. Sweet, A. M. Grejs, S. Christensen, M. Haenggi, A. Levis, A. Lundin, J. Düring, S. Schmidbauer, T. R. Keeble, G. V. Karamasis, C. Schrag, E. Faessler, O. Smid, M. Otáhal, M. Maggiorini, P. D. Wendel Maillard, P. Jaubert, J. M. Cole, M. Solar, O. Borgquist, C. Leithner, S. Abed-Maillard, L. Navarra, M. Annborn, J. Undén, I. Brunetti, A. Awad, P. McGuigan, R. Bjørkholt Olsen, T. Cassina, P. Vignon, H. Langeland, T. Lange, H. Friberg, and N. Nielsen, for the TTM2 Trial Investigators*

TTM2

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PAM > 65 mmHg

Température ?

+ Priorité : empêcher la fièvre !!!

- ↑ **excitation neuronale**
- ↑ **production de radicaux libres**
- ↑ **besoins métaboliques**
- ↑ **inflammation**
- ↑ **pression intra-crânienne**

AGGRAVATION DES LESIONS CEREBRALES

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PAM > 65 mmHg

Température ?

+ Et chez nous, que faisons-nous ?

AP-HP. Centre
Université
de Paris

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PAM > 65 mmHg

Température ?

+ Durée de la prévention de la fièvre après arrêt-cardiaque

No. at Risk

Temperature control for 36 hr
Temperature control for 72 hr

393	293	281	276	274	268	267
396	289	279	275	273	268	266

H. Schmidt et Al. NEJM 11.2022

SaO₂ = 94-98%

Surv. EtCO₂

HGT < 10 mmol/l

PAM > 65 mmHg

Température ?

+ Pourquoi sédater ?

Avantages

- Diminuer la consommation cérébrale en oxygène
- Eviter les poussées tensionnelles
- Eviter la désadaptation au respirateur

Inconvénients

- Tolérance hémodynamique
- Retard d'évaluation neurologique

+ Comment ?

période 1

période 2

- *période d'incertitude*
- *évaluation neuro + précoce*

+ Protocole MIR Cochin

PROPOFOL

REMIFENTANIL

Démarrer à :
1 mg/kg/h

Démarrer à :
10 µg/kg/h

Evaluation à 15min

Objectif RASS -5 et BPS 3

NON

NON

≥ 0,1 mg /kg /h
Dose max
4mg/kg/h

≥ 1 µg /kg /h
Dose max
18µg/kg/h

Poids	Vitesse de démarrage propofol	Vitesse de démarrage rémifentanil	Paliers	Vitesse max du propofol	Vitesse max du rémifentanil
50kg	5 ml/h	5 ml/h	0,5 ml/h	20 ml/h	9 ml/h
55kg	5,5 ml/h	5,5 ml/h	0,55 ml/h	22 ml/h	9,9 ml/h
60kg	6 ml/h	6 ml/h	0,6 ml/h	24 ml/h	10,8 ml/h
65kg	6,5 ml/h	6,5 ml/h	0,65 ml/h	26 ml/h	11,7 ml/h
70kg	7 ml/h	7 ml/h	0,7 ml/h	28 ml/h	12,6 ml/h
75kg	7,5 ml/h	7,5 ml/h	0,75 ml/h	30 ml/h	13,5 ml/h
80kg	8 ml/h	8 ml/h	0,8 ml/h	32 ml/h	14,4 ml/h
85kg	8,5 ml/h	8,5 ml/h	0,85 ml/h	34 ml/h	15,3 ml/h
90kg	9 ml/h	9 ml/h	0,9 ml/h	36 ml/h	16,2ml/h
95kg	9,5 ml/h	9,5 ml/h	0,95 ml/h	38 ml/h	17,1ml/h
100kg	10 ml/h	10 ml/h	1 ml/h	40 ml/h	18ml/h
105kg	10,5 ml/h	10,5 ml/h	1,05 ml/h	42 ml/h	18,9ml/h
110kg	11 ml/h	11 ml/h	1,1 ml/h	44 ml/h	19,8ml/h
115kg	11,5ml/h	11,5 ml/h	1,15 ml/h	46 ml/h	20,7ml/h
120kg	12 ml/h	12 ml/h	1,2 ml/h	48 ml/h	21,6ml/h

Messages clés

- **SaO₂ normale : 94-98% et éviter l'hypoxie et l'hyperoxie**
- **Cibler une PaCO₂ normale : 35 – 45 mmHg et éviter l'hypocapnie**
- **Cibler une glycémie < 10mmol/L et éviter les hypoglycémies**
- **Cibler une PAM > 65 mmHg et effectuer un monitoring invasif de la PA**
- **Eviter l'hyperthermie**

Merci de votre attention